



Τα νεαρά τεύτλα από τη στιγμή που φυτρώνουν και μέχρι τα 6-8 φύλλα είναι ευαίσθητα και κινδυνεύουν να καταστραφούν. Για να προλάβετε και έτσι να αποφύγετε αυτές τις ζημιές θα πρέπει:


- να ελέγχετε συχνά και συστηματικά τα σπαρμένα με τεύτλα χωράφια από την πρώτη στιγμή του φυτρώματος σ' όλη την έκτασή τους.
- να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των Γεωπονικών Υπηρεσιών, όπως
 - Τήρηση της **αμειψισποράς** την αλλαγή δηλαδή, της καλλιέργειας κάθε χρόνο στο χωράφι (καλλιέργεια τεύτλων μια φορά στα τέσσερα χρόνια).
 - **Πρώιμη σπορά** για να αποφύγουμε τα έντομα, τα οποία όταν είναι έτοιμα να προσβάλλουν τα φυτά θα είναι ήδη ανεπτυγμένα και έτσι οι ζημιές θα είναι μικρότερες.
 - **Γρήγορη ανάπτυξη φυτών**: Κάθε καλλιεργητική εργασία, όπως σωστό βάθος σποράς, καλή προετοιμασία σποροκλίνης, σκαλίσματα και σωστή λίπανση βοηθούν ώστε τα φυτά να αναπτυχθούν γρηγορότερα για να αντιμετωπίσουν καλλίτερα τους κινδύνους από ζημιές εντόμων.
- **Χρήση φυτοφαρμάκων** : Είτε προληπτικά (επενδεδυμένος σπόρος, κοκκώδη) δηλαδή πριν την εμφάνιση των εντόμων ή όταν εμφανισθούν με ψεκασμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης φυτοφαρμάκων.
- Μη χρησιμοποιείτε μεγαλύτερες δόσεις από αυτές που συνιστούν οι Γεωπονικές Υπηρεσίες.
- Τα ψεκαστικά μηχανήματα να είναι καθαρά, συντηρημένα και σωστά ρυθμισμένα.

Είδος εντόμου Αντιμετώπιση

Σιδεροσκώληκας



- Επενδυτικά εντομοκτόνα σπόρου CAUCHO ή CARBOFURAN
- Γραμμική εφαρμογή κοκκωδών εντομοκτόνων
- Σε αγρούς με ιστορικό έντονης προβολής και κυρίως όταν η προηγούμενη καλλιέργεια είναι σιτηρά, πατάτα, μηδική, καλαμπόκι, κ.λ.π. μπορεί να γίνει και συνδυασμός των δύο παραπάνω εφαρμογών.

Κλεονός - Τανύμεκος




Τέλεια έντομα (σκαθάρια): Τα επενδυτικά και τα κοκκώδη δεν δίνουν ικανοποιητική προστασία.

Επιβάλλονται 1-2 ψεκασμοί των νεαρών τεύτλων τις μεσημβρινές ώρες με τα εξής εντομοκτόνα:

- Methidathion 40% 105 κ.ε./στρ. ή
- Endosulfan 50% 250 γρ./στρ. ή
- Fenthion 50% 100 κ.ε./στρ. + Methyl-parathion 20% 200 κ.ε./στρ.

ή - Endosulfan 150κ.ε./στρ. + Methyl-parathio 150κ.ε./στρ.

Προνύμφη (άσπρο σκουλήκι εδάφους): Σε ορισμένες περιοχές η προνύμφη του κλεονού που αναπτύσσεται στο έδαφος προκαλεί ζημιές στα αναπτυγμένα τεύτλα τρώγοντας τα ριζίδια. Σε αγρούς με ιστορικό προσβολής, συνιστάται ψεκασμός του εδάφους και ενσωμάτωση, κατά την προετοιμασία του εδάφους, με ένα από τα παρακάτω εντομοκτόνα: Λιντέιν 25% 500 κ.ε./στρ. ή Carbosulfan 25% 700-1000 κ.ε./στρ. ή Diazinon 40% 1-1,5 lit/στρ.



Κοφτοσκώληκα



- Τα επενδυτικά εντομοκτόνα δεν διασφαλίζουν την καταπολέμησή τους και έτσι επιβάλλονται ψεκασμοί τις απογευματινές ή νυκτερινές ώρες με τα παρακάτω εντομοκτόνα:

πυρεθρίνες (cypermethrin, deltamethryn, flucithrinat, S-fenvalerate) από 30-50 κ.ε./στρ., Endosulfan 200-300 γρ./στρ. ή Chlorpyrifos 25% 150-200 κ.ε./στρ.

Άλτης




- Επενδυτικά εντομοκτόνα σπόρου κυρίως με GAUCHO ή CARBOFURAN.

• Σε περιπτώσεις υψηλών πληθυσμών που προκαλούν σημαντικές ζημιές ακόμη και σε αναπτυγμένα τεύτλα, τότε συνιστώνται ψεκασμοί κυρίως τις μεσημβρινές ώρες με τα ίδια εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του κλεονού ή ακόμη και με Carbaryl 85% (KARBEZAL, SEVIN) σε δόσεις 150 γρ./στρ.

Συνιστώμενα κοκκώδη εντομοκτόνα εδάφους

- COUNTER 5G ή ΤΕΡΜΟΥΦΩΣ 5G σε δόση 800 γρ./στρ.
- CURATER 10G ή FURADAN 10G (Carbofuran 10%) στη δόση 1000 γρ./στρ.
- MARSHAL 5G (Carbosulfan 5%) στη δόση των 1200 γρ./στρ.
- DURSBAN 5G (Chlorpyrifos 5%) στη δόση 1200 γρ./στρ.
- DOTAN 5G (Chlormephos 5%) στη δόση των 800 γρ./στρ.
- TEMIK 10G (Aldicarb 10%) στη δόση 1000 γρ./στρ.

;Όλα τα πιο πάνω εντομοκτόνα είναι απ' αυτά που έχουν έγκριση κυκλοφορίας στα τεύτλα.



ΤΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ

- Αποφύγετε κάθε επαφή του φαρμάκου ή του ψεκαστικού υγρού με το δέρμα. Αν γίνει τυχαία, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Μη καπνίζετε και μη τρώτε την ώρα του ψεκασμού ή όταν ετοιμάζετε το διάλυμα του φαρμάκου.
- Φροντίζετε να μη πέφτει φάρμακο πάνω σε χόρτα που μπορεί να βοσκήσουν ζώα ή σε νερά καναλιών και ποταμών.
- Αν στην περιοχή υπάρχουν μελίσσια, προτιμήστε τα φάρμακα που είναι λιγότερο τοξικά για τις μέλισσες. Οι γεωπόνοι θα σας τα υποδείξουν.
- Μη μολύνετε τα σημεία υδροληψίας την ώρα που γεμίζετε το βυτίο του ψεκασμού.
- Μην πετάτε οπουδήποτε τα δοχεία ή τις σακούλες των φαρμάκων. Υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν από άλλους ή από παιδιά, ενώ ταυτόχρονα μολύνεται το περιβάλλον. Συγκεντρώστε τα και κάψτε τα προσεκτικά ή παραχώστε τα βαθιά, μακριά από κανάλια και γεωτρήσεις.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ, ΤΗ ΖΩΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.

Αριθ. Τηλεφώνου Κέντρου Δηλητηριάσεων 010 / 7793 777

Για περισσότερες πληροφορίες
ρωτήστε τον Τομέαρχη σας.

Δεκέμβριος 2001
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.

